

code.[®]

BIOLABS

GUÍA DE USO
PROSPECTO DIGITAL

AGONISTA DUAL GIP / GLP-1

Tirzepatida

20_{mg}

PRESENTACIÓN

Solución lista

VOLUMEN

2 mL

CONCENTRACIÓN

10 mg/mL

FRECUENCIA

1 vez por semana

- Use este producto según la indicación y bajo la supervisión de su médico.

[01] QUÉ ES

Qué es y cómo actúa

La tirzepatida es un péptido que imita a dos hormonas intestinales naturales, GIP y GLP-1. Se utiliza en el control de la glucosa en diabetes tipo 2 y en el manejo del peso corporal, junto con alimentación adecuada y actividad física.

GIP

+

GLP-1

UNA MOLÉCULA · DOS RECEPTORES

PÁNCREAS

Libera insulina solo cuando la glucosa está elevada.

CEREBRO

Aumenta la saciedad y reduce el apetito.

ESTÓMAGO

Hace más lento el vaciamiento gástrico.

[02] ANTES DE COMENZAR

Antes de comenzar

Su médico valorará si este tratamiento es adecuado para usted.

NO ESTÁ INDICADO SI

- Usted o un familiar ha tenido carcinoma medular de tiroides o síndrome MEN 2.
- Ha tenido una reacción alérgica a la tirzepatida.
- Está embarazada o planea un embarazo. Si lo planea, su médico le indicará suspenderlo 2 meses antes.

COMENTE CON SU MÉDICO SI

- **Usa anticonceptivos orales:** pueden perder eficacia; añada un método de barrera al iniciar y tras cada ajuste de dosis.
- **Usa insulina o sulfonilureas:** puede ser necesario ajustar su dosis.
- **Tendrá una cirugía o sedación:** informe que usa tirzepatida.
- **Está lactando o tiene antecedentes de** pancreatitis, retinopatía diabética, enfermedad renal o gastroparesia.

[03] ENTREGA

Llega listo para aplicar

El vial viene listo para aplicar: ya ha sido reconstituido con agua bacteriostática. Lo enviamos en un sobre térmico con geles refrigerantes que mantienen la cadena de frío.

20 mg

TIRZEPATIDA

2 mL

VOLUMEN DEL VIAL

10 mg/mL

LISTA PARA APLICAR

- 1 Al recibir su pedido, abra el sobre térmico y confirme que los geles sigan fríos.
- 2 Guarde el vial de inmediato en el refrigerador, entre 2 y 8 °C.
- 3 Revise en la etiqueta el lote y la fecha de caducidad.

[04] EQUIVALENCIAS

Su dosis en la jeringa

Su médico le indicará su dosis. Así se mide en una jeringa de insulina U-100 con la solución a 10 mg/mL.

DOSIS	VOLUMEN	JERINGA	POR VIAL
2.5 mg	0.25 mL	25 U	8 dosis
5 mg	0.5 mL	50 U	4 dosis
7.5 mg	0.75 mL	75 U	2 dosis
10 mg	1.0 mL	100 U	2 dosis
12.5 mg	1.25 mL	125 U	1 dosis
15 mg	1.5 mL	150 U	1 dosis

BARRA · ESCALA DE JERINGA DE 1 mL (100 U)

1 mg equivale a 0.1 mL y a 10 unidades en jeringa U-100. Las dosis que superan 100 U requieren una jeringa graduada en mL de mayor capacidad o dividir la dosis en dos aplicaciones.

[05] APLICACIÓN

Cómo aplicar

1 Lávese las manos y limpie el tapón con alcohol. Con una jeringa de insulina nueva y estéril, cargue aire en la misma cantidad de su dosis, inserte la aguja en el vial, inyecte el aire y extraiga la dosis exacta indicada.

2 Aplíquela bajo la piel en una de estas zonas y rote el sitio en cada aplicación.

ABDOMENA 5 cm del
ombligo**MUSLO**

Parte frontal

BRAZO

Parte posterior

3 Aplíquela el mismo día cada semana, con o sin alimentos.

TIP Mantenga el vial o la pluma en un lugar o recipiente hermético.

SI OLVIDA UNA DOSIS**≤ 4 días**Aplíquela en cuanto
lo recuerde.**> 4 días**Omítala y continúe
en su día habitual.

Deje al menos 3 días entre dos dosis.

[06] CONSERVACIÓN

Cómo conservarlo

2-8 °C

Siempre en refrigeración, dentro de su caja y protegido de la luz.

EN TRÁNSITO

Sobre térmico con geles refrigerantes.

EN CASA

Usar dentro de los 90 días, debidamente refrigerado.

- No lo congele. Si se congeló, deséchelo.
- Mantenga fuera del alcance de los niños.
- Deseche las jeringas en un contenedor rígido.

LOTE **VER ETIQUETA**

FAB. / CAD.: VER ETIQUETA DEL VIAL

code.[®]

B I O L A B S

PREMIUM PEPTIDES ■ USA MADE

Precisión en cada
dosis.



@codebiolabs
codebiolabs.com

AVISO

Use este producto únicamente según la indicación y bajo la supervisión de un profesional de la salud. Esta guía es informativa y no sustituye la consulta médica.